

DIABETES MELLITUS

SAIBA MAIS COM
A SUGAR E O SPIKE





A **Sugar** e o **Spike** começaram a manifestar alguns sinais que levaram os seus donos a suspeitar que algo não estava bem e a levá-los ao Médico Veterinário.



Eu bebia muita água. O meu dono tinha que me estar sempre a levar à rua para eu fazer xixi.



Eu dormia muito e quando não estava a dormir estava a comer.

Sabia que a probabilidade de um CÃO ou GATO ter diabetes é de cerca de

Sinais que indicam que o seu animal poderá ter diabetes:

- Aumento da frequência de micção
- Consumo de água excessivo
- Aumento do apetite
- Perda de peso, apesar do apetite aumentado
- Letargia

Fatores de risco que estão associados à diabetes:

- Animal de meia idade ou geriátrico
- Gato macho castrado
- Cadela não esterilizada
- Obesidade (em especial nos gatos)

As visitas regulares ao Médico Veterinário permitiram que a **Sugar** e o **Spike** fizessem as análises necessárias e fossem diagnosticados com diabetes, começando a receber um tratamento adequado.

Agora já se sentem muito melhor!

1 EM CADA 100 A 1 ?¹
1 EM CADA 500 ?



TRATAMENTO DA DIABETES *MELLITUS*

Tomar conhecimento que o seu cão ou gato sofre de diabetes pode ser um choque ao início, mas não se preocupe porque esta doença pode ser controlada com sucesso e os animais diabéticos podem ter uma vida normal.

A Sugar e o Spike não podem alterar o facto de terem diabetes, mas podem fazer muita coisa para se manterem saudáveis. Aqui ficam algumas dicas para proteger a saúde dos animais diabéticos:



Alimentação saudável - respeite as indicações fornecidas pelo Médico Veterinário;



Exercício físico regular - ajude o seu cão ou gato a manter o peso ideal, estimulando-o a brincar e a passear;



Tratamento médico adequado - cumpra as recomendações do seu Médico Veterinário.



Se achar que o seu animal não está bem leve-o ao Médico Veterinário - só assim poderá detetar problemas de saúde numa fase inicial.

A INSULINA

A insulina é uma hormona produzida por células especiais localizadas no pâncreas. Nos cães e gatos diabéticos, estas células não produzem uma quantidade suficiente de insulina para satisfazer as necessidades do organismo. Quando isto acontece a glucose não consegue entrar nas células e começa a acumular-se na corrente sanguínea. Felizmente, a administração regular de insulina pode ajudar a prevenir que isto aconteça.

O Médico Veterinário irá determinar a dose de insulina para o seu animal de estimação e irá ensinar-lhe como efetuar a administração.

Após algumas semanas de tratamento, o Médico Veterinário irá verificar a evolução clínica e os níveis de glucose no sangue do seu animal de estimação. Nesta fase pode ser necessário ajustar a dose de insulina para assegurar o controlo ideal da diabetes.

VETPEN®

Uma forma simples de ajudar a controlar a diabetes

A VetPen® é uma caneta de insulina destinada apenas para animais de estimação diabéticos e concebida para o ajudar a facilitar o tratamento da diabetes.



1
Assinale a dose de insulina prescrita



2
Para realizar a injeção, pressione o botão de libertação e mantenha durante 5 segundos



O seu Médico Veterinário irá explicar-lhe tudo o que precisa de saber sobre como cuidar do seu animal de estimação diabético.



PEQUENAS ALTERAÇÕES QUE PODEM FAZER UMA GRANDE DIFERENÇA:

- Peça ajuda aos seus familiares e amigos para não oferecerem guloseimas e outras recompensas ao seu cão ou gato;
- Monitorize o apetite, a ingestão de água e o exercício físico realizado pelo seu animal de estimação. Alterações nestes parâmetros podem indicar que algo não está bem;
- Os níveis de glucose no sangue e na urina podem também ser monitorizados em casa caso seja indicado pelo Médico Veterinário.

EVITAR COMPLICAÇÕES

A reação adversa mais frequente da terapêutica com insulina é a redução dos níveis de glucose no sangue, denominada hipoglicémia. A hipoglicémia pode ser fatal. Felizmente, conhecer as suas causas pode ajudá-lo a evitá-la:

- Administração excessiva de insulina
- Alteração na dieta
- Exercício excessivo
- Doença



OS SINAIS DE HIPOGLICÉMIA PODEM OCORRER SUBITAMENTE E PODEM INCLUIR:

- Fraqueza
- Depressão
- Falta de coordenação
- Letargia
- Espasmos musculares
- Convulsões
- Coma





O QUE FAZER SE O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO TIVER UMA CRISE DE HIPOGLICÊMIA

SE O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ESTIVER **CONSCIENTE:**

1. Coloque uma pequena quantidade de uma fonte de glicose (por exemplo, açúcar em pó) nos seus dedos e friccione nas gengivas do cão ou gato (não tente forçar a alimentação, uma vez que existe o risco de se poder engasgar);
2. A glicose é rapidamente absorvida em 1 a 2 minutos, após este período o seu animal de estimação deve começar a responder;
3. Quando o animal estiver alerta e se encontrar sentado, alimente-o com uma pequena refeição;
4. Contacte o seu Médico Veterinário para verificar se é necessário marcar uma consulta.

SE O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO ESTIVER **INCONSCIENTE** OU A **TER UMA CONVULSÃO:**

CONTACTE O SEU MÉDICO VETERINÁRIO
IMEDIATAMENTE – ISTO É UMA EMERGÊNCIA!





Para mais informações sobre Diabetes consulte:

www.petdiabetesmonth.pt



Todas as marcas registadas aqui referidas são propriedade dos respetivos donos.

Copyright ©2013 Intervet International B.V., a subsidiary of Merck & Co., Inc.

Todos os direitos reservados.

MSD Animal Health
Quinta da Fonte
Edifício Vasco da Gama, N° 19
2770-192 Paço de Arcos
Portugal